

Diez primeras causas de morbilidad de los pacientes intervenidos en cirugía, por grupos de edad y sexo de acuerdo a capítulos de la CIE-10. 2020

Ord.	Causas de morbilidad según CIE-10	Frecuencia	Porcentaje	Grupo de edad						Sexo		Destino a la salida de la cirugía	
				-1	1-4	5-14	15-44	45-59	60 +	F	M	Hospitalización	Alta
1	APENDICITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	256	2.3%	0	6	83	135	21	11	104	152	137	119
2	FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DE LA TIBIA	160	1.5%	0	0	3	118	25	14	41	119	119	41
3	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	151	1.4%	0	0	2	97	29	23	45	106	11	140
4	FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA	122	1.1%	0	0	9	94	15	4	22	100	100	22
5	APENDICITIS, NO ESPECIFICADA	120	1.1%	0	5	22	74	13	6	48	72	62	58
6	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	110	1.0%	0	1	10	48	22	29	59	51	81	29
7	ESGUINCES Y TORCEDURAS QUE COMPROMETEN EL LIGAMENTO CRUZADO	109	1.0%	0	0	3	100	5	1	29	80	20	89
8	FRACTURA DEL FEMUR, PARTE NO ESPECIFICADA	96	0.9%	1	2	3	62	11	17	37	59	89	7
9	OSTEOMIELITIS, NO ESPECIFICADA	87	0.8%	0	0	5	36	31	15	24	63	81	6
10	COLICO RENAL, NO ESPECIFICADO	87	0.8%	0	0	0	55	24	8	35	52	54	33
Subtotal		1,298	11.8%	1	14	140	819	196	128	444	854	754	544
Total General		10,983	100.0%	256	341	703	4,839	2,086	2,758	4,229	6,754	7,712	3,271

Fuente de Información: Departamento de Informática en salud